

หงส์





การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร : Animalia

ไฟลัม : Chordata

ชั้น : Aves

อันดับ : Anseriformes

วงศ์ : Anatidae

วงศ์ย่อย : Anserinae

สกุล : Cygnus, Bechstein, 1803

Species : 6-7 living, see text.

synonyms : Cygnanser Kretzoi, 1957

สารบัญ

- **1 หงส์ขาว : Mute Swan**
 - 1.1 ลักษณะทั่วไป
 - 1.2 ถิ่นอาศัย, อาหาร
 - 1.3 สถานที่ชม
- **2 หงส์ดำ : Black Swan**
 - 2.1 ลักษณะทั่วไป
 - 2.2 ถิ่นอาศัย, อาหาร
 - 2.3 พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
 - 2.4 สถานที่ชม

หงส์ขาว : Mute Swan



ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : *Cygnus olor*

ลักษณะทั่วไป

ขนาดใกล้เคียงกับหงส์ดำ แต่มีขนสีขาวทั้งตัว จะงอยปากสีเหลืองส้มและมีปุ่มสีดำที่ฐานของปาก ขณะว่ายน้ำลำคอจะตั้งเป็นรูปตัวเอส มีความสวยสง่างาม จึงถูกนำมาเลี้ยงไว้ตาม [สวนสาธารณะ](#) และ [สวนสัตว์ทั่วโลก](#)

ถิ่นอาศัย, อาหาร

พบแพร่กระจายอยู่แถบ [เอเชีย](#) [ยุโรปเหนือ](#) และ [อเมริกา](#) หงษ์ขาวอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินพืชน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็กตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่

สถานที่ชม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่

หงส์ดำ: Black Swan



ลักษณะทั่วไป

ตัวผู้มีสีขนทั่วตัวดำอมเทา ยกเว้นขนปีกสำหรับบินเส้นขาวเท่านั้นที่เป็นสีขาวซึ่งตัดกับลำตัวเห็นเด่นชัดสะดุดตานัยน์ตาสีแดงเข้ม จะงอยปากสีแดงแต่มีแถบขาว ปลายปาก ขาและเท้าสีดำ หงส์ดำตัวเมียเหมือนตัวผู้ทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กกว่าและลำคอสั้นกว่าเล็กน้อย

ถิ่นอาศัย, อาหาร

มีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะทัสมาเนีย [ออสเตรเลีย](#) หงส์ดำ [ฟินแลนด์](#) [ตุรกี](#) [ตุรกี](#) [ตุรกี](#)

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์

ชอบอยู่ตามแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม [ทะเลสาบ แม่น้ำ](#) หนองน้ำ ชอบอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เสียงร้องเหมือนเสียงทรมเป็ตมักร้องในตอนเย็นหรือกลางแสงจันทร์ในคืนเดือนหงายขณะกำลังบิน หงส์ดำวางไข่ครั้งละ 5-6 ฟอง ไข่มีสีขาวแกมเขียว ระยะเวลาฟักไข่นาน 34-37 วัน

สถานที่ชม

[สวนสัตว์เปิดเขาเขียว](#) [สวนสัตว์เชียงใหม่](#) [สวนสัตว์นครราชสีมา](#) [สวนสัตว์สงขลา](#)

*** หมายเหตุ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

- [วิกิพีเดีย](#)

- [หมูหินคอตคอม](#)

- [หมูหินคอตคอม](#)

Retrieved from

"<http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C>"